


COLDISEPT NANO SILVER

Ústny sprej

SK



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zdravotnícka pomôcka vo forme spreja na podpornú liečbu zápalu hrdla spôsobeného bakteriálnou alebo plesňovou infekciou.

Zdravotnícka pomôcka COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej vytvára ochrannú bariéru na sliznici, a tým ju chráni pred fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi.

COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej pomáha potláčať nepríjemné pocity v krku zvlnčením vysušenej sliznice, a tým výrazne tlmi príznaky zápalu ako sú bolest a pálenie. Pripravok vytvára gélovú vrstvu, ktorá chráni sliznicu v ústach a krku pred baktériami a vírusmi.

Vodný roztok sodných, draselných, vápenatých a horečnatých solí obsiahnutý v prípravku čistí hrdlo, znížuje opuch sliznice v krku a v nose a podporuje regeneráciu podráždených sliznic.

Pripravok obsahuje nanočasticie striebra, ktoré potláčajú rast baktérií. Silica z mäty prieornej pomáha čistiť nosovú dutinu, tlmi kašeľ a zlepšuje dýchanie.

ZLOŽENIE

Čistená voda, nanočasticie koloidného striebra, extrakt z riasy *Chondrus crispus* (írsky mach), sorbitol, glycerín, minerálne soli (dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý hexahydrtát, chlorid horečnatý hexahydrtát), silica z mäty prieornej, benzoan sodný, kyselina citrónová.

POUŽITIE

COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej účinne podporuje liečbu:

- zápalu sliznic v ústnej dutine a krku;
- zápalu mandlí;
- stavu po vybrati mandlí.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Vedľajšie účinky zdravotníckej pomôcky COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej nie sú známe, napriek tomu však, najmä u citlivých osôb, nie je možné vylúčiť alergické príznaky. V prípade, že sa objaví alergická reakcia, ukončite používanie prípravku.

Akákoľvek závažná udalosť súvisiaca s touto zdravotníckou pomôckou musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému národnému orgánu.

Prišlušný národný orgán pre zdravotnické pomôcky v SR: Štátny ústav pre kontrolu liecov, Kvetná ul. 11, SK-825 08, Bratislava 26.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na ktorokoľvek jeho zložku.

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na kovové striebro.

Zabráňte kontaktu s očami.

Ukončite používanie prípravku v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použitelihosti!

Tehotné ženy a deti do 6 rokov môžu prípravok používať len pod lekárskym dohľadom.

Pripravok môže byť používaný dlhodobo bez rizika návyku, vedľajších účinkov a komplikácií.

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Pripravok používajte 3-4 x denne podľa individuálnej potreby.

Pred prvým použitím stlačte dávkovač niekoľkokrát.

Vložte aplikátor čo najhlbšie do úst a nasmerujte ho do krku.

Aplikujte 3-4 dávky (stlačením aplikátora).

UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Balenie 20 ml

VÝZNAM SYMBOLOV:

	Číslo šarže		Pozri návod na používanie		Výrobca
	Použiteľné do		Dátum výroby		Horná hranica teploty

Dátum poslednej revízie textu: 1.9.2020